

Diabetes (suikerziekte)



54%

respons


3000

ingevulde vragenlijsten



28 juni - 30 juli

2017



5 min

voor max. 24 vragen

Type 1

4%

Type 2

94%

De rest heeft een andere vorm van diabetes (suikerziekte)

**Middelen die gebruikt worden
om diabetes/suikerziekte te regelen**

Insuline



12%

Tabletten



65%

Insuline



23%

Toedieningsysteem insuline

Insulinepomp



8%

Insulinepen



66%

Hervulbare
insulinepen




26%

Wordt er gevraagd naar wijzigingen?



Zijn er wijzigingen in het insulinegebruik?



Altijd

12%

Soms

21%

Nooit

67%

Bij wie onder controle?

Internist



20%

Huisarts



39%

Diabetes verpleegkundige



48%

POH






33%

Dokters-assistente




4%

Of u goed bent ingesteld





Hoe u dat weet

Labwaardes



Arts/verpleegkundige





78%



houdt de bloedsuikerwaarden bij in een overzicht

Of u de bloedsuikerwaarden extra controleert in onderstaande gevallen

			koorts 44%
			diarree 37%
			overgeven 35%

hypo



vermoeidheid, honger, zweten, duizeligheid, trillen, hoofdpijn, wisselend humeur, slecht zicht

47% heeft weleens een hypo

hyper



vermoeidheid, slaperigheid, droge mond, dorst, vaak moeten plassen

25% heeft weleens een hyper

Wat doet u als u een hypo heeft?

tabletten druivensuiker of een suikerdrankje innemen



63%

brood, biscuitjes of fruit eten



56%

Glucagon wordt gebruikt



112 bellen



Wat doet u als u een hyper heeft?

water (of iets anders zonder suiker) drinken



31%



bewegen (bijvoorbeeld naar buiten)

20%



Insuline bijspuiten

20%



112 bellen

95%

kan een hypo of hyper zonder de hulp van anderen oplossen



6%

heeft glucagon in huis

hiervan heeft

26%

glucagon weleens gebruikt


en heeft

87%

mensen in de omgeving die weten hoe ze glucagon moeten toedienen

De apotheek gaat na of u nog glucagon in huis heeft

Heeft u nog glucagon in huis?



Regelmatig

6%

Soms


7%

Nooit

86%

Tot wanneer is uw glucagon nog houdbaar?

Tot wanneer is uw glucagon nog houdbaar?



Regelmatig

7%

Soms

5%

Nooit

88%

36%

heeft in het afgelopen jaar antibiotica gebruikt

36%

controleerde de bloedsuiker in dat geval extra

Advies

Controleer uw bloedsuikerwaarden extra in de volgende gevallen:

- Bij ziekte (koorts, overgeven of diarree)
- Bij het gebruik van antibiotica

Dit omdat bovenstaande situaties schommelingen in de bloedsuikerwaarden kunnen veroorzaken

Als u glucagon in huis heeft is het verstandig om van tijd tot tijd de houdbaarheidsdatum te controleren



Hartelijk dank

voor het meedoen!